

Laevolac sciroppo

lattulosio

Composizione

Sciroppo 180 ml 100 ml di sciroppo contengono: lattulosio g 66,7. Altri componenti: acido sorbico (E 200) g 0,08; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Forma farmaceutica e Confezione - Flacone di sciroppo da 180 ml.

Nome ed indirizzo del Titolare dell'autorizzazione all'immissione in Commercio e del Produttore - Boehringer Mannheim Italia S.p.A. – Viale Monza, 270 – 20128 Milano
Officina di produzione: Viale G.B. Stucchi, 310 – 20052 Monza (MI)

Categoria farmacoterapeutica: regolatore della funzione intestinale.

Indicazioni

Adulti Stipsi cranica. Coadiuvante nelle affezioni batteriche intestinali. Bambini e lattanti Stipsi. Trattamento delle sindromi putrefattive dovute a disordini alimentari. Come correttivo della dieta del lattante in particolar modo nel passaggio dall'allattamento materno a quello artificiale.

Controindicazioni

Ipersensibilità verso uno dei componenti del prodotto. Galattosemia

Opportune precauzioni per l'uso

Pur essendo il principio attivo di Laevolac uno zucchero scarsamente assorbibile e non metabolizzato, per la presenza di altri zuccheri quali lattosio, galattosio e tagatosio, nei pazienti diabetici è necessario informare il medico.

Interazioni

I pazienti in terapia digitalica devono informare il medico prima di iniziare il trattamento. E' possibile un trattamento sinergico con la neomicina. Agenti antibatterici ad ampio spettro d'azione ed antiacidi, somministrati per via orale contemporaneamente al lattulosio, possono limitarne l'efficacia terapeutica.

Avvertenze speciali

Non usare il farmaco se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dopo un breve periodo di trattamento, se non si ottengono risultati apprezzabili, consultare il proprio medico curante.

Posologia e modo di somministrazione

Adulti

Dose iniziale	Dose di mantenimento
---------------	----------------------

Stipsi lieve	1 cucchiaino da tavola/die	2 cucchiaini da caffè/die
--------------	----------------------------	---------------------------

Stipsi grave	1-2 cucchiaini da tavola/die	2-3 cucchiaini da caffè/die
--------------	------------------------------	-----------------------------

Stipsi ostinata	2-3 cucchiaini da tavola/die	2-4 cucchiaini da caffè/die
-----------------	------------------------------	-----------------------------

Bambini

1- 6anni	1 -2 cucchiaini da caffè/die	1 cucchiaino da caffè/die
----------	------------------------------	---------------------------

6-14 anni	1 cucchiaino da tavola/die	2 cucchiaini da caffè/die
-----------	----------------------------	---------------------------

Lattanti	1 cucchiaino da caffè/die	1 cucchiaino da caffè/die
----------	---------------------------	---------------------------

Un cucchiaino da tavola = 15 ml = 10 g di lattulosio

Un cucchiaino da caffè = 5 ml = 3,3 g di lattulosio

La quantità complessiva può essere assunta in un'unica dose, preferibilmente la mattina a digiuno o la sera prima del pasto. Il prodotto può essere diluito in acqua, latte o altre bevande. Nei bambini non superare i 7 giorni di terapia senza consultare il medico. Non superare le dosi consigliate.

Sovradosaggio

Sintomatologia: diarrea, crampi addominali.

Trattamento: sospensione del farmaco.

Effetti indesiderati

In rari casi Laevolac può causare produzione di gas e crampi addominali. Tali sintomi sono, in genere, di lieve entità e recedono spontaneamente dopo i primi giorni di trattamento. Solo in caso di comparsa di diarrea è opportuno sospendere la terapia. Qualunque effetto indesiderato non descritto deve essere comunicato al medico o al farmacista.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

Ultima revisione da parte del Ministero della Sanità: Marzo 1995