

商品名：キサンプン注射用20mg

英名：Xanbon Injection 20mg

一般名：オザグレルナトリウム Ozagrel Sodium

適用区分：くも膜下出血術後

**この薬の作用と効果について**

・クモ膜下出血の手術をした後に血管が収縮することによっておこる脳虚血症状を改善します。

注射の前に確認すること

・次のような人は注射のまえに主治医に申し出てください：
以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。
出血している、脳塞栓症、心臓が悪い、大梗塞、抗血小板剤・血栓溶解剤・抗凝血剤を投与している。

・この注射を行う期間：
通常、2週間連続して注射します。

・注射の方法：
通常、電解質液または糖液に溶解し、24時間かけて静脈内に点滴します。

・その他：
授乳中の方や、妊婦または妊娠の可能性のある方は申し出てください。

副作用について

・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。
◎次のような症状に気づいたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に申し出てください：
<出血>頭痛、血便、血尿、皮下出血
<ショック・アナフィラキシー様症状> 血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、冷感、蒼白、発汗
<肝機能障害、黄疸> 皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、食欲不振
<血小板減少> 血が止まりにくい、歯ぐきの出血、あざができる
<白血球減少、顆粒球減少> 発熱、悪寒、咽頭痛、全身倦怠感
<腎機能障害> 顔のむくみ、尿量減少、全身倦怠感
<喘息(様)発作> 咳が出る、呼吸困難
<そう痒・発疹・蕁麻疹・紅斑> 赤い斑点が出る、かゆみ
<上室性期外収縮・血圧下降> 動悸、たちくらみ、めまい

◆次のような症状に気づいたら、早めに主治医や薬剤師、看護師に相談してください：

◇上記のほかに次のような副作用が出ることがあります：
<食欲不振> <発熱> <頭痛>

・他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。

注射のあとに注意していただくこと**その他(コメント)****説明日****説明者**

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。
更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。

商品名：キサボン注射用40mg

英名：Xanbon Injection 40mg

一般名：オザグレルナトリウム Ozagrel Sodium

適用区分：くも膜下出血術後

**この薬の作用と効果について**

・クモ膜下出血の手術をした後に血管が収縮することによっておこる脳虚血症状を改善します。

注射の前に確認すること

・次のような人は注射のまえに主治医に申し出てください：
以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。
出血している、脳塞栓症、心臓が悪い、抗血小板剤・血栓溶解剤・抗凝血剤を投与している。

・この注射を行う期間：
通常、2週間連続して注射します。

・注射の方法：
通常、電解質液または糖液に溶解し、24時間かけて静脈内に点滴します。

・その他：
授乳中の方や、妊娠または妊娠の可能性のある方は申し出てください。

副作用について

・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。
◎次のような症状に気づいたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に申し出てください：

<出血>頭痛、血便、皮下出血
<ショック・アナフィラキシー様症状>蒼白、発汗、血圧低下、呼吸困難
<肝機能障害、黄疸>皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、食欲不振
<血小板減少>血が止まりにくい、歯ぐきの出血、あざができる
<白血球減少、顆粒球減少>発熱、咽頭痛、全身倦怠感
<腎機能障害>顔のむくみ、尿量減少、全身倦怠感
<喘息(様)発作>咳が出る、呼吸困難
<そう痒・発疹・蕁麻疹・紅斑>赤い斑点が出る、かゆみ
<上室性期外収縮・血圧下降>動悸、たちくらみ、めまい

◆次のような症状に気づいたら、早めに主治医や薬剤師、看護師に相談してください：

◇上記のほかに次のような副作用が出ることがあります：
<食欲不振><発熱><頭痛>

・他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。

注射のあとに注意していただくこと**その他（コメント）****説明日****説明者**

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。
更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。

商品名：キサボン注射用20mg

英名：Xanbon Injection 20mg

一般名：オザグレルナトリウム Ozagrel Sodium

適用区分：脳血栓症

**この薬の作用と効果について**

・脳の血管がつまる急性期の脳血栓症に伴っておこる手足の麻痺などを改善します。

注射の前に確認すること

・次のような人は注射のまえに主治医に申し出てください：
以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。
出血している、脳塞栓症、心臓が悪い、大梗塞、抗血小板剤・血栓溶解剤・抗凝血剤を投与している。

・この注射を行う期間：
通常、2週間連続して注射します。

・注射の方法：
通常、電解質液または糖液に溶解し、2時間かけて1日朝夕2回、静脈内に点滴します。

・その他：
授乳中の方や、妊婦または妊娠の可能性のある方は申し出てください。

副作用について

・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。
◎次のような症状に気づいたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に申し出てください：
＜出血＞頭痛、血便、血尿、皮下出血
＜ショック・アナフィラキシー様症状＞血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、冷感、蒼白、発汗
＜肝機能障害、黄疸＞皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、食欲不振
＜血小板減少＞血が止まりにくい、歯ぐきの出血、あざができる
＜白血球減少、顆粒球減少＞発熱、悪寒、咽頭痛、全身倦怠感
＜腎機能障害＞顔のむくみ、尿量減少、全身倦怠感
＜喘息(様)発作＞咳が出る、呼吸困難
＜そう痒・発疹・蕁麻疹・紅斑＞赤い斑点が出る、かゆみ
＜上室性期外収縮・血圧下降＞動悸、たちくらみ、めまい

◆次のような症状に気づいたら、早めに主治医や薬剤師、看護師に相談してください：

◇上記のほかに次のような副作用が出ることがあります：
＜貧血＞＜嘔気＞＜下痢＞＜食欲不振＞＜発熱＞＜頭痛＞＜悪寒・戦慄＞

・他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。

注射のあとに注意していただくこと**その他（コメント）****説明日****説明者**

<p>商品名：キサノン注射用40mg 英名：Xanbon Injection 40mg 一般名：オザグレルナトリウム Ozagrel Sodium 適用区分：脳血栓症</p>	
<p>この薬の作用と効果について</p> <ul style="list-style-type: none">・脳の血管がつまる急性期の脳血栓症に伴っておこる手足の麻痺などを改善します。	
<p>注射の前に確認すること</p> <ul style="list-style-type: none">・次のような人は注射のまえに主治医に申し出てください： 以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。 出血している、脳塞栓症、心臓が悪い、抗血小板剤・血栓溶解剤・抗凝血剤を投与している。・この注射を行う期間： 通常、2週間連続して注射します。・注射の方法： 通常、電解質液または糖液に溶解し、2時間かけて1日朝夕2回、静脈内に点滴します。・その他： 授乳中の方や、妊娠または妊娠の可能性のある方は申し出てください。	
<p>副作用について</p> <ul style="list-style-type: none">・薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 <p>◎次のような症状に気づいたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に申し出てください：</p> <ul style="list-style-type: none"><出血>頭痛、血便、皮下出血<ショック・アナフィラキシー様症状>蒼白、発汗、血圧低下、呼吸困難<肝機能障害、黄疸>皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、食欲不振<血小板減少>血が止まりにくい、歯ぐきの出血、あざができる<白血球減少、顆粒球減少>発熱、咽頭痛、全身倦怠感<腎機能障害>顔のむくみ、尿量減少、全身倦怠感<喘息(様)発作>咳が出る、呼吸困難<そう痒・発疹・蕁麻疹・紅斑>赤い斑点が出る、かゆみ<上室性期外収縮・血圧下降> 動悸、たちくらみ、めまい <p>◆次のような症状に気づいたら、早めに主治医や薬剤師、看護師に相談してください：</p> <p>◇上記のほかに次のような副作用が出ることがあります：</p> <ul style="list-style-type: none"><貧血><嘔気><下痢><食欲不振><発熱><頭痛><悪寒・戦慄> <ul style="list-style-type: none">・他にもからだの異常を感じたら、主治医や薬剤師、看護師に相談してください。	
<p>注射のあとに注意していただくこと</p>	
<p>その他(コメント)</p>	
<p>説明日</p>	
<p>説明者</p>	

*ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。
更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。